

# ADJUVANT M.O. Poudre

Bentonites sélectionnées – Alginate

CLARIFICATION DES VINS EN BOUTEILLES EN METHODE CHAMPENOISE

## CARACTERISTIQUES

- ◆ L'**ADJUVANT M.O. POUDRE** est un adjuvant de remuage de dernière génération. Les colloïdes alginiques rassemblent les levures grâce à une composition voisine de celle de certains constituants des parois cellulaires des levures. Les colloïdes minéraux alourdissent et tassent l'ensemble de la masse du dépôt. Chaque lot, de chacun des constituants, est soigneusement contrôlé par des tests entièrement originaux.
- ◆ Dès qu'il est injecté, l'**ADJUVANT M.O.** floccule et rassemble toutes les parties du trouble. Les levures sont énergiquement retenues dans les flocons.
- ◆ A la mise des bouteilles sur lattes, l'**ADJUVANT M.O.** tapisse le verre auquel il n'adhère pas et forme une couche qui isole les levures du verre. Les levures sont contenues dans cette couche et s'y multiplient.  
Après 4 mois de repos sur lattes, le dépôt présente une grande cohérence. Les fragments de dépôt sont lourds et comportent très peu d'éléments fins.
- ◆ Le poignettage classique devient inutile, voir préjudiciable.  
Au remuage, l'**ADJUVANT M.O.** glisse rapidement vers le col, d'une façon cohérente et sans laisser de traces sur le verre.  
Il est d'une égale efficacité, tant pour le remuage manuel que pour le remuage automatique.

## DOSE D'EMPLOI

- ◆ 4 grammes de poudre par hectolitre de vin à tirer pour un ensemencement moyen de 1 à 1,5 millions de cellules par millilitre de vin.



## MODE D'EMPLOI

- ◆ Effectuer une suspension préalable en faisant gonfler 50 g de poudre par litre d'eau distillée ou de source froide. Ne jamais utiliser de vin. Pour cela saupoudrer l'**Adjuvant M.O.** dans l'eau maintenue en agitation. Laisser en contact pendant 12 à 24 heures environ et agiter de nouveau. La suspension liquide est prête.
- ◆ Injecter la quantité nécessaire d'adjuvant dans la quantité correspondante de levain préalablement isolé dans une petite cuve. Utiliser un DOSACOL (raccord de collage).
- ◆ Ensuite, le levain ayant reçu l'adjuvant sera injecté dans le vin de la cuve de tirage. Utiliser également un DOSACOL pour cette opération.
- ◆ Maintenir l'agitation pendant la durée du tirage.
- ◆ La suspension d'adjuvant doit être utilisée dans la journée suivant sa mise en oeuvre.

## CONDITIONNEMENT

- ◆ Sachet de 1 kg - carton de 20 x 1 kg.

## CONDITIONS DE CONSERVATION

- ◆ Emballage plein, scellé d'origine, à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et exempt d'odeur.
- ◆ Emballage ouvert : à utiliser rapidement.