



STATION
GENOTECHNIQUE
DE CHAMPAGNE

ВСПОМОГА
ТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ADJUVANT MC (ДОБАВКА MC)

Осветление игристых вин, произведенных классическим методом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОБАВКА MC - это сбалансированная смесь различных видов фармацевтических бентонитов.

Применение бентонитов из различных источников позволяет использовать бентониты наилучшего качества.

После укладки бутылок на решетки, **ДОБАВКА MC** не прилепает к стеклу и формирует изолирующий слой. Во время ремюажа дрожжи постепенно направляются к горлышку бутылки, не оставляя следов на стекле.

Осадок получается плотным, и при его удалении кусочек льда получается небольшим.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ДОБАВКА MC очень эффективна для осветления вина после вторичного брожения в бутылке.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Добавка эффективна при использовании пюпитра. Но ее формула была составлена для быстрых ремюажей, которые проводятся автоматически с помощью устройств Gyropalette®.

ДОЗИРОВКА

ДОБАВКА MC порошок:

3,5 - 5,5 г порошка на гл. вина для внесения в среднем 1 - 1,5 миллиона клеток на мл. вина.

ДОБАВКА MC жидкость:

8 сл / гл вина.

Максимально допустимая дозировка, согласно европейскому действующему законодательству: не предусмотрена

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ДОБАВКА MC порошок:

Необходимо предварительно приготовить жидкую суспензию в воде.

Для приготовления суспензии из **ДОБАВКИ MC** использовать предпочтительно емкость с центральной мешалкой. Для суспензий незначительного объема можно использовать электрический сверлильный аппарат с винтом (200 оборотов в минуту).

Для приготовления 100 л. суспензии **ДОБАВКИ MC** :

Залить в емкость 80 л. холодной воды (никогда не использовать вино) и включить мешалку. Насыпать 4 кг **ДОБАВКИ MC** в перемешиваемую воду. Перемешивать 1 час.



STATION
GENOTECHNIQUE
DE CHAMPAGNE



Через час завершить перемешивание. Затем, добавить воды до общего объема 100 л и перемешивать 5 минут.

Для приготовления препарата дать настояться 48 - 72 часа.

Перед применением или для доведения до кондиции для последующего использования - перемешивать.

Использовать жидкую суспензию из соображения 8 - 12 сл / гл (80 - 120 мл / гл) вина.

Перед применением разбавить 1 к 1 водой.

Отделить необходимое количество фермента для брожения вина и ввести него необходимое количество добавки с помощью муфты для проведения оклейки. Обеспечить контакт 30 минут.

Затем, ввести смесь "дрожжи + добавка" в смесь "вино + ликер".

Аккуратно привести в однородное состояние. Продолжать перемешивать во время тиража.

Внимание: Если препарат должен быть использован больше, чем через неделю, добавить 7 мл. **ВАКТОЛ 150.**

ДОБАВКА МС жидкость:

ДОБАВКА МС должна быть внесена в дрожжевую разводку. Выбрать необходимое количество разводки и измерить необходимое количество **ДОБАВКИ МС. Затем, разбавить 1 к 1 холодной водой.**

Вносить медленно и постепенно разбавленную суспензию с помощью автоматической дозировочной помпы или муфты для оклейки, монтированной к центробежному насосу. Во втором случае установить насосную цепь между верхом и низом емкости с разводкой и медленно закачивать добавку через муфту для оклейки. Затем, закачивать смесь "разводка - добавка" в емкость с вином, уже содержащим ликер.

Размешивать вино во время внесения в него препаратов и тиража.

Меры предосторожности

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии

Использовать в соответствии с действующими нормами

УПАКОВКА

Мешки 1 кг

Бидон 10 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов

Использовать как можно быстрее открытую упаковку

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.

275/2020 – 2/2