



STATION
OENOLOGIQUE
DE CHAMPAGNE



ADJUVANT MO (Добавка MO)

Селекционированный бентонит - Альгинат
Осветление игристых вин, произведенных классическим методом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ADJUVANT MO (ДОБАВКА MO) в порошке - это добавка для проведения ремюажа последнего поколения. Альгиновые коллоиды собирают вокруг себя дрожжи, благодаря их составу, схожему с некоторыми составляющими клеточных оболочек дрожжей. Минеральные коллоиды утяжеляют и уплотняют осадок. Каждая партия компонентов препарата тщательно контролируется.

ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- При попадании в вино **ADJUVANT MO (ДОБАВКА MO)** образует хлопья и собирает воедино все мутные компоненты. Дрожжи притягиваются к хлопьям.
- После укладки бутылок, **ADJUVANT MO (ДОБАВКА MO)** не прилипает к стеклу и формирует изолирующий слой. Дрожжи содержатся и размножаются в этом слое.
- За 4 месяца формируется хороший осадок. Фрагменты осадка тяжелые и содержат мало мелких компонентов. Классическое встряхивание бутылок становится бесполезным, и даже вредным.
- Во время ремюажа **ДОБАВКА MO** быстро направляются к горлышку бутылки, не оставляя следов на стекле.
- Препарат одинаково эффективен для ручного и автоматического ремюажа.

ДОЗИРОВКА

4 г порошка на гл. вина для внесения в среднем 1 - 1,5 миллиона клеток на мл. вина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо предварительно приготовить жидкую суспензию в воде.

Для приготовления суспензии из **ADJUVANT MO (ДОБАВКА MO)** использовать предпочтительно емкость с центральной мешалкой. Для суспензий незначительного объема можно использовать электрический сверлильный аппарат с винтом (200 оборотов в минуту).

Для приготовления 100 л. суспензии **ADJUVANT MO (ДОБАВКА MO)**:

- Залить в емкость 80 л. холодной воды (никогда не использовать вино). Включить мешалку.
- Насыпать **ADJUVANT MO (ДОБАВКА MO)** в перемешиваемую воду. Дозировка 50 г/л, то есть 5 кг порошка.
- Перемешивать 1 час.
- Через час завершить перемешивание. Затем, добавить воды до общего объема 100 л и перемешивать 5 минут.
- Для приготовления препарата дать настояться 24 - 48 часа.
- Перед применением или для доведения до кондиции для последующего использования - перемешивать.
- Если готовый препарат должен быть использован больше, чем через неделю, добавить 7 мл. **BAKTOL 150/л.**



STATION
OENOLOGIQUE
DE CHAMPAGNE



Использовать жидкую суспензию из соображения 6 - 8 сл / гл (60 - 80 мл / гл) вина.
Влить необходимое количество добавки в соответствующий объем дрожжевой разводки, предварительно помещенную в маленькую емкость. Использовать DOSACOL (устройство для оклейки).

Затем, разводка с добавленной в нее добавкой должны быть влита в вино в тиражной емкости. Для этой операции использовать также DOSACOL.

Продолжать перемешивать во время тиража.

Меры предосторожности:

Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии

Использовать в соответствии с действующими нормами

УПАКОВКА

Пакет 1 кг. Упаковка из 20 пакетов по 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних запахов.

Использовать как можно быстрее открытую упаковку.

Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании.

275/2020 – 2/2